

УДК 582.594.2

Е.П. Жоголь, И.А. Хрусталева

## Распространение некоторых орхидных на левобережье Оби

При обработке гербарного материала, собранного в 1995-1996 годах на левобережье Оби в пределах Алтайского края, обнаружены местонахождения некоторых видов семейства орхидные, которые не отмечались ранее в региональных флористических сводках [1, 2, 3].

*Cypripedium calceolus* L. ранее на левобережье Оби отмечался в окрестностях Барнаула и с. Усть-Луковки [1, 2]. Новые местонахождения этого вида обнаружены нами в Алеусской ленте бора в окрестностях сел Высокая Грива (Панкрушихинский р-н), Прыганка и Подборное (Крутыхинский р-н). Встречается в светлых смешанных лесах по окраинам болот.

*Cypripedium guttatum* Sw. Встречается довольно редко. На левобережье Оби Крылов [1] приводит по одной точке для каждой ленты бора. Нами собран в следующих точках: в Бурлинской ленте в окрестностях сел Спирено Крутыхинского р-на и в Панкрушиха Панкрушихинского р-на; в Кулундинской ленте подтверждена точка, приведенная Крыловым [1], в окрестностях с. Усть-Мосиха Ребрихинского р-на; в Касмалинской ленте — в окрестностях с. Паново Ребрихинского р-на; в Барнаульской ленте — в окрестностях с. Песчаное Топчихинского р-на. *Cypripedium guttatum* встречается, как правило, по окраинам болот или болотистых низин в березняках, березово-сосновых лесах.

*Cypripedium macranthon* Sw. отмечался ранее только для территории, прилегающей к Оби в ленточных борах. Нами найден в окрестностях сел Шадруха Угловского р-на и Новосоветское Егорьевского р-на. Этот вид встречается по окраинам болот в сосново-березовых лесах.

*Corallorrhiza trifida* Chatel. Встречается изредка в ленточных борах с хорошо развитым мохово-лишайниковым покровом и разреженным травостоем. Нами отмечен в Бурлинской ленте в окрестностях сел Подборное Крутыхинского р-на и Панкрушиха Панкрушихинского

р-на, в Кулундинской ленте — в окрестностях сел Шарчино Тюменцевского р-на и Усть-Мосиха Ребрихинского р-на, в Касмалинской ленте — в окрестностях с. Паново Ребрихинского р-на.

*Dactylorhiza salina* (Turcz. ex Lindley) Soo отмечалась Крыловым [1] только в Касмалинской ленте в окрестностях с. Бутырки, нами найден этот вид в окрестностях с. Клочки Ребрихинского р-на в пойме р. Касмалы.

*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soo обитает по влажным низинам и окраинам болот в ленточных борах. Крылов [1] отмечает этот вид в Касмалинской ленте в окрестностях с. Бутырки и в Барнаульской ленте у д. Костин Лог. Нами отмечался практически на всем протяжении Барнаульской ленты бора (окрестности сел Шадруха Угловского р-на, Коробейниково Шипуновского р-на, Песчаное Топчихинского р-на, ст. Штабка Павловского р-на), в Бурлинской ленте в окрестностях сел Подборное Крутыхинского р-на и Прыганка Панкрушихинского р-на.

*Epipactis helleborine* (L.) Crantz встречается в ленточных борах по травянистым низинам. В Бурлинской ленте собран в окрестностях сел Спирено, Подборное Крутыхинского р-на и в Прыганка Панкрушихинского р-на, в Кулундинской ленте — в окрестностях сел Усть-Мосиха Ребрихинского р-на, Шарчино Тюменцевского р-на. Ранее [1, 3] были известны местонахождения в Барнаульской ленте у с. Четремное и в Касмалинском бору у д. Клочки.

*Orchis militaris* L. Довольно редко встречается на лугах, в лесных массивах на опушках. На левобережье Оби отмечался в окрестностях Барнаула [1, 2]. Нами найден в Алеусской ленте бора в окрестностях сел Подойниково (Панкрушихинский р-он), а также в Прыганке (Крутыхинский р-н) в пойме р. Бурла, в Барнаульской ленте в Егорьевском районе — в с. Новосоветском, в Касмалинской ленте — в д. Клочки.

### Литература

1. Крылов П.Н. Флора Западной Сибири. Т. 3. Томск, 1927.
2. Верещагин В.И. Определитель растений окрестностей Барнаула. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1988. 302 с.
3. Иванова Е.В. Семейство Orchidaceae// Флора Сибири. 1987. С. 125-146.